

Tabelle 1. Anteil der verschiedenen Fußregionen an der Gesamtkraft in Prozent (mit Standardabweichung).

	Schritt 1 (n=30 Probanden, n=60 Füße)			Schritt 2 (n=30 Teilnehmer, n=60 Füße)			ONEWAY ANOVA (p-Werte)
	Dyna- misch (Emed®- Plattform)	Standbild (Emed®- Plattform)	KIOP® (wach)	Statisch (Pliance®- Matte)	KIOP® (wach)	KIOP® (anästhe- siert)	1. p-Wert, Schritte 1 & 2; 2. p-Wert, Schritte 1 & 2 ohne dynamische Messung; 3. p-Wert, Schritt 1 allein; 4. p-Wert, Schritt 2 allein
Prozentwerte der Gesamtkraft							
<i>Vergleich Rückfuß gegen Vorfuß</i>							
Rückfuß	61,78±8,3	59,81±8,3	60,95±4,8	62,79±8,8	60,28±6,1	62,31±6,4	0,184; 0,156; 0,331; 0,144
Vorfuß	38,22±8,3	40,19±8,3	39,05±4,8	37,21±8,8	39,72±6,1	37,68±6,4	0,184; 0,156; 0,331; 0,144
<i>Vergleich medial gegen lateral</i>							
Medial	57,01±7,2	56,48±9,6	50,82±7,0	49,60±8,4	49,73±6,3	50,40±6,5	<0,05; 0,765 ; <0,05; 0,819
Lateral	43,99±7,2	43,52±9,6	49,18±7,0	50,40±8,4	50,27±6,3	49,60±6,5	<0,05; 0,765 ; <0,05; 0,819
<i>Aufteilung des Fußes in 10 Felder</i>							
Rückfuß	61,73±8,3	57,87±7,3	56,08±6,4	57,2±11,1	52,66±9,0	54,5±10,4	<0,05; 0,550 ; <0,05; 0,053
Mittelfuß	4,68±2,6	9,58±5,8	7,96±5,9	9,59±5,5	12,09±6,3	8,48±5,7	<0,05; 0,061 ; <0,05; 0,063
1. Metat.-köpfchen	6,51±2,7	5,71±2,7	9,36±3,3	6,33±2,9	6,75±3,3	8,28±3,6	<0,05; 0,068 ; <0,05; 0,124
2. Metat.-köpfchen	6,31±2,2	6,03±2,4	7,20±1,9	6,94±2,9	7,15±2,1	8,39±2,5	<0,05; 0,075 ; <0,05; 0,087
3. Metat.-köpfchen	6,87±2,2	6,83±2,3	7,55±1,9	7,99±2,9	8,32±2,0	8,60±2,8	<0,05; 0,097 ; 0,120 ; 0,387
4. Metat.-köpfchen	4,3±1,4	5,41±1,7	5,14±1,4	6,24±2,2	6,53±2,0	6,06±2,5	<0,05; 0,072 ; <0,05; 0,567
5. Metat.-köpfchen	2,12±0,7	3,07±1,2	2,31±0,9	2,92±1,6	3,06±1,5	2,75±1,5	<0,05; 0,143 ; <0,05; 0,556
Großzehe	5,55±2,4	1,81±1,9	3,26±2,9	1,60±2,0	1,77±1,6	1,78±1,4	<0,05; 0,219 ; <0,05; 0,775
2. Zehe	0,92±0,4	0,54±1,6	0,46±0,4	0,33±0,3	0,52±0,4	0,42±0,4	<0,05; 0,081 ; 0,220 ; 0,067
3. – 5. Zehe	1,01±0,8	3,14±5,4	0,68±0,6	0,87±1,0	1,16±1,4	0,74±0,7	<0,05; 0,157 ; <0,05; 0,117