

Tabelle 4. Einfluss der Erfahrung des Operateurs auf Rate der Modifikation nach Anwendung ISO-C-3D und ARCADIS-3D

Status Operateur und Anzahl des Status ISO-C-3D ARCADIS	Fallzahl einzelner Operateur ISO-C-3D ARCADIS	Anzahl Modifikationen nach Anwendung ISO-C-3D und ARCADIS-3D		
		Gesamt	Implantposition	Reposition / Korrektur
Chefarzt (n=1) (n=1)	13 28	4/13 (31%) 10/28 (36%)	3/13 (23%) 7/28 (25%)	2/13 (15%) 5/28 (17%)
Oberarzt (n=4) (n=4)	7 / 6 / 5 / 3 = 21 3 / 3 / 7 / 3 = 16	8/21 (38%) 6/16 (38%)	5/21 (24%) 4/16 (25%)	4/21 (19%) 2/16 (13%)
Facharzt (n=2) (n=3)	26 / 1 = 27 8 / 4 / 3 = 15	12/27 (44%) 4/15 (27%)	8/27 (29%) 4/15 (27%)	6/27 (22%) 2/15 (13%)
Assistenzarzt (n=1) (n=1)	1 3	0/1 1/3 (33%)	0/1 1/3 (33%)	0/1 1/3 (33%)
Operteure gesamt (n=8) (n=9)	62 62	24/62 (39%) 21/62 (34%)	16/62 (26%) 16/62 (26%)	12/62 (19%) 10/62 (25%)